<table>
<tr><td>名稱</td><td colspan="2">水稻(Oryza sativa)</td></tr>
<tr><td>英名</td><td colspan="2">Rice</td></tr>
<tr><td>科別</td><td colspan="2">禾本科</td></tr>
<tr><td>台灣主要產地</td><td colspan="2">雲林縣(26864 公頃))、彰化縣(19983 公頃)、台中市(12272 公頃)</td></tr>
<tr><td>簡介</td><td colspan="2">稻為禾本科稻屬植物，以亞洲栽培稻為主，可區分為日本型稻(japonica rice)、印度型稻(indica rice)及爪哇型稻(javanica rice)等 3 種類型。是台灣最主要糧食作物。<br>由於稻作不耐低溫，只能在熱帶或亞熱帶地區栽培。在溫帶地區，可選擇溫暖季節種植。稻之最適生長溫度是 25~30°C，苗期若遇氣溫低於 10 °C,宜有保溫措施。稻具耐水特性，通常年雨量在 1,200 公厘以上，或具灌溉設施地區均可栽培。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">天然災害</td><td>颱風豪雨</td><td>葉片破損、水稻倒伏、田區淹水，災後病害嚴重，授粉不良造成稔實率降低，穗上發芽</td></tr>
<tr><td>寒害凍害</td><td>葉色黃化、萎凋死亡或爛秧影響花序分化，形成空穗或稻穀及枝梗退化現象</td></tr>
<tr><td>焚風</td><td>白穗、穗數減少，穀粒變小、心腹背白或不稔實率增加</td></tr>
<tr><td>參考文獻</td><td colspan="2">台灣農家要覽農作篇(一)。2005。</td></tr>
</table>